

SEATOP SUPER

SEATOP – SUPER, es bioestimulante a base de extracto de algas, proveniente de *Ascophyllum Nodosum*, de alta concentración, gracias a su formulación polvo soluble.

SeaTop Super es rico en materia orgánica, con un alto contenido de macro y micronutrientes, azúcares, carbohidratos y fitohormonas naturales de fácil y rápida absorción.

Su aplicación temprana promueve el desarrollo vegetativo, mejorando la calidad y condición de los frutos. También ayuda a reducir el estrés hídrico, térmico y salino.

- Ayuda al desarrollo temprano de la planta.
- Promueve la producción natural de fitohormonas.
- Mejora las defensas naturales de la planta.
- Incrementa producción y calidad.
- Uniforma periodo de cosecha.

METALES PESADOS

Plomo ≤ 20 ppm
Cadmio ≤ 2 ppm
Arsénico ≤ 8 ppm
Mercurio ≤ 2 ppm

INGREDIENTE ACTIVO

Ascophyllum 18%
Nodosum

ENVASE

1kg – 5kg – 10kg

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Ácido Algínico	18 %
Materia orgánica	50 %
Nitrógeno	1 %
Potasio	18 %
Citoquininas- Giberelinas	600-800 ppm
Fósforo	1%
Hierro	0,81 %
Solubilidad	100 %
PH	8-10
Densidad (20°)	0,38 Kg/L
Carbono	30- 35 %

FORMULACIÓN Polvo Soluble

RECOMENDACIONES DE USO

ESPECIE	FOLIAR DOSIS GRS X 100 LTS.	FERTIRRIEGO DOSIS KG/Há	OBSERVACIONES
Uva Vinífera	30 - 100	1 a 4	2 – 3 aplicaciones a partir con brotes de 10-20 cm hasta cuaja. Fertirrigación: 2 – 3 veces durante periodo de plántula y etapa de crecimiento
Uva de mesa			
Kiwi			
Nectarin			
Ciruelo			
Duraznero			
Peral			
Manzano			
Cerezo			
Almendro			
Nogal			
Avellano Europeo			
Palto			
Naranja, Limón, Mandarino			
Olivo			1 a 2 aplicaciones, a partir con brotes de 10 a 20 cm - Fruto de 5 a 10 mm. Fertirrigación: 2 – 3 veces durante periodo de plántula y etapa de crecimiento
Frutales Menores			2 a 3 aplicaciones a partir de cuaja. Con intervalos de 7-10 días. Fertirrigación: 2 – 3 veces durante periodo de plántula y etapa de crecimiento
Hortalizas		1 a 2	2 a 3 aplicaciones, a partir de los 20 días después del trasplante. Aplicar con intervalos de 7-10 días. Fertirrigación: 2 – 3 veces durante periodo de plántula y etapa de crecimiento
Cereales			2 a 3 aplicaciones, a partir de los 20 días después de la siembra – aplicar con intervalos de 10 días Fertirrigación: 2 – 3 veces durante periodo de plántula y etapa de crecimiento
Arándanos, Frutillas, Frambuesa, Mora, Cranberry.		1 a 4	En fruto recién cuajado repetir a los 7 y 14 días. Fertirrigación: 2 - 3 veces durante el periodo de plantula y crecimiento.

IMPORTANTE:

- **Fitotoxicidad :** No tiene problemas de toxicidad en las dosis recomendadas
- **Compatibilidad:** Se puede mezclar con otros fitosanitarios. Sin embargo hacer una prueba de miscibilidad antes de la primera aplicación
- **Advertencias:** en la utilización del producto, no superar dosis máxima por aplicación. El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido.
- **Almacenamiento y transporte:** Mantener el producto libre de humedad para evitar aglomeraciones
- **Toxicología:** no existen problemas de toxicidad por ser un extracto de carácter natural
- **Tiempo de reingreso:** Sin restricciones de reingreso
- **Caducidad:** 5 años.

**SEATOP
SUPER**



**IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO
EN CHILE POR:**
 Importadora Río Ebro SPA
 Bello Horizonte 845/ Of 703
 Rancagua Chile
 Contacto / 722279158