



AMIN PLUS

Aminplus, es un bioestimulante con alto contenido de L-aminoácidos libres y microelementos esenciales para los procesos fisiológicos de la planta. Es obtenido mediante hidrólisis enzimática natural de plantas de soja, maíz y otros vegetales.

Este aumenta significativamente la producción de proteínas y la actividad fotosintética, permitiendo un aumento notable en el crecimiento de follaje, calibre condición del fruto y producción de la planta.

- Protege a la planta de situaciones de estrés biótico o abiótico.
- Mejora procesos fisiológicos de la planta.
- Estimula el crecimiento de la biomasa.
- Disminuye la incidencia de algunas enfermedades de las plantas.
- Mejora la producción de clorofila, lo cual promueve el proceso de fotosíntesis.

METALES PESADOS

Plomo ≤ 20 ppm
 Cadmio ≤ 2 ppm
 Arsénico ≤ 2 ppm
 Mercurio ≤ 2 ppm

INGREDIENTE ACTIVO

L- Aminoácidos Libres

ENVASE

5 Kg – 10 Kg

COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Aminoácidos Totales	25 %
Zn	2.4 %
Fe	3.7 %
Cu	1.0 %
Mn	3.7 %
Solubilidad	100%
PH	5-6
Densidad (20°)	0,43 Kg/L

FORMULACIÓN Polvo Soluble

ESPECIE	FOLIAR DOSIS GRS X 100 LTS.	FERTIRRIEGO DOSIS KG/Há	OBSERVACIONES
Uva de Mesa	100 - 150	3 - 5	2 a 3 aplicaciones, a partir con brotes de 10-15 cm para estimular crecimiento. Repetir a los 10-15 días - Se recomienda aplicar en situaciones de estrés biótico o abiótico. Fertirrigación: 2 – 3 veces durante periodo de plántula y etapa de crecimiento.
Kiwi			
Nectarino			
Ciruelo			
Duraznero			
Peral			
Manzano			
Cerezo			
Almendro			
Nogal			
Avellano Europeo			
Palto			
Naranja, Limón, Mandarino			
Olivo			
Frutales Menores			2 a 3 aplicaciones, a partir de brotación y post cuaja - Se recomienda aplicar en situaciones de estrés biótico o abiótico. Fertirrigación: 2 – 3 veces durante periodo de plántula y etapa de crecimiento
Hortalizas de Hoja		2	2 a 3 aplicaciones, a partir de 10 días después de trasplante - Repetir a los 15 días. Fertirrigación: 2 – 3 veces durante periodo de plántula y etapa de crecimiento.
Hortalizas			
Cereales		2-3	2 a 3 aplicaciones, a partir de los 20 días después de la siembra – aplicar con intervalos de 10 días. Fertirrigación: 2 – 3 veces durante periodo de plántula y etapa de crecimiento
Arándanos, Frutillas, Frambuesa, Mora, Cranberry.		1 a 4	Aplicar desde caída de pétalos repetir cada 7 a 10 días Fertirrigación: 2 -3 veces durante el periodo de plántula y crecimiento

IMPORTANTE:

Fitotoxicidad: No tiene problemas de toxicidad en las dosis recomendadas.

Compatibilidad: Se puede mezclar con otros fitosanitarios y nutrientes. Sin embargo, hacer una prueba de miscibilidad antes de la primera aplicación. Se recomienda no mezclar junto a cobres, fosfitos y azufres.

Advertencias En la utilización del producto, no superar dosis máxima por aplicación. El fabricante garantiza la composición, formulación y contenido.

Almacenamiento y transporte: Mantener el producto libre de humedad para evitar aglomeraciones.

Toxicología: no existen problemas de toxicidad por ser un extracto de carácter natural.

Tiempo de reingreso: Sin restricciones de reingreso.

Caducidad: 5 años.



AMIN PLUS



IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO
EN CHILE POR:
Importadora Río Ebro SPA
Bello Horizonte 845/ Of 703
Rancagua Chile
Contacto / 722279158